DENSIDAD MINERAL ÓSEA Y SCORE DE HUESO TRABECULAR EN ADULTOS CON HIPOFOSFATEMIA LIGADA AL CROMOSOMA X Y OSTEOMALACIA INDUCIDA POR TUMOR

Alberth Burnier Cáceres¹, Macarena Jimenez Vial², Luciana Pinto Valadares³, Annette Lucy Madison Rostagno², Danisa Nevenka Ivanovic-zuvic Seeger⁴, Maria Belen Zanchetta⁵, Pablo Felipe Florenzano Valdes²

1. Departamento de Endocrinología. Hospital Las Higueras, Talcahuano. Chile.

2. Departamento de Endocrinología. Pontificia Universidad Católica de Chile.

3. Rede SARA de Hospitais de Reabilitação. Brasilia. Brasil.

4. Hospital Salvador/Universidad de Chile. Santiago de Chile.

5. Instituto de Investigaciones Metabólicas - Universidad del Salvador. Buenos aires. Argentina.

PF y BZ han recibido research grants de Ultragenyx.

INTRODUCCIÓN

01

La **hipofosfatemia ligada al cromosoma X (XLH)** es la causa más común de hipofosfatemia hereditaria que se manifiesta como raquitismo en niños y osteomalacia en adultos.

02

La **osteomalacia inducida por tumor (OIT)** es una enfermedad paraneoplásica poco frecuente que se caracteriza por fracturas frecuentes, dolor óseo, debilidad muscular y alteración en la marcha.

INTRODUCCIÓN

Es importante diferenciar ambas patologías dado las diferentes estrategias de tratamiento para cada una de ellas.

Diferenciar entre ellas puede ser difícil, especialmente cuando las pruebas genéticas son negativas y no se identifica un tumor causal.

INTRODUCCIÓN

Reportes sobre la densidad mineral ósea (DMO) y el score de hueso trabecular (TBS) en XLH y OIT son escasos.

OBJETIVO Y DISEÑO EXPERIMENTAL

Describir y Comparar
la densidad mineral ósea y
TBS en pacientes con
XLH y TIO

Diseño experimental:
Estudio transversal

OBJETIVO Y DISEÑO EXPERIMENTAL

- **Se reclutaron pacientes provenientes de 3 instituciones académicas:**
- Rede SARAHA de Hospitais de Reabilitação. Brasilia. Brasil.
- Instituto de investigaciones metabólicas. Buenos aires. Argentina
- CETREN UC, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago. Chile.

SUJETOS Y MÉTODOS

Sujetos con XLH confirmados para la mutación del gen PHEX y sujetos con OIT

Se les realizó DXA GE/Lunar

Un endocrinólogo especializado evaluó la DMO y TBS

DISEÑO EXPERIMENTAL Y MÉTODOS

1

Se obtuvieron **datos clínicos y bioquímicos** de los pacientes.

2

Se les realizó **estudios bioquímicos**: calcio, fósforo, 25-OH- vitamina D, PTH, FGF 23 intacto, fosfatasa alcalina.

3

Se les realizó **DXA GE/Lunar** de columna lumbar, cuello femoral, cuerpo entero y antebrazo. Se definieron las puntuaciones Z en comparación con la base de datos NHANES.

RESULTADOS

Hipofosfatemia Ligada al Cromosoma X (XLH)

51 adultos

78.4 % mujeres

Edad media de 35
años

RESULTADOS

Osteomalacia Inducida por Tumor (OIT)

18 adultos

66.6% mujeres

Edad media de inicio
de los síntomas fue
de 41 años

Tiempo medio desde
el inicio de los
síntomas al
diagnóstico correcto
fue de 5 años

RESULTADOS

	Hipofosfatemia ligada al cromosoma X	Osteomalacia Inducida por Tumor
Femeninos	40 (78,4%)	12 (66,6%)
Edad (años)	35 (18-69)	41 años (18-65)
Fósforo (mg/dL)	2,1 (1,1-3,9)	1,7 (0,8-3,6)
Fosfatasa Alcalina (U/L)	161 (52-643)	495 (89-1839)
FGF 23-intacto (RU/mL)	187	601

RESULTADOS

BIOQUÍMICOS

Sujetos con OIT v/s
XLH tuvieron:

Fósforo sérico
significativamente
más bajo (1,7
versus 2,1 mg/dL,
 $p < 0,05$).

Niveles séricos más
altos de **Fosfatasas
alcalinas** (495
versus 161 UI/L,
 $p < 0,01$)

Niveles séricos
más altos de
FGF23 (601 versus
187 RU/mL,
 $p < 0,001$)

RESULTADOS

Puntuación Z DMO mas baja en **columna lumbar** en osteomalacia inducida por tumor.
($p < 0,01$)

RESULTADOS

Puntuación Z DMO mas baja en **cuello femoral** en osteomalacia inducida por tumor.
($p < 0,01$)

RESULTADOS

TBS
XLH

Media

Puntuación Z: 1,2

TBS
OIT

Media

Puntuación Z: -0,1

Puntuación Z de TBS fue mas baja en en osteomalacia inducida por tumor.
($p < 0,01$)

RESULTADOS

Análisis de curva ROC

Para el cuello femoral
una puntuación Z
mayor de -0.1

Sensibilidad de 100% y
una especificidad del
70% para el
diagnóstico de XLH

CONCLUSIONES

1

Los sujetos con OIT y XLH mostraron diferencias significativas en DMO y TBS.

2

Estos datos pueden utilizarse como herramienta diagnóstica para diferenciar OIT de XLH utilizando puntos de corte específicos de DMO.

¡Muchas gracias!

SOCIEDAD CHILENA DE
OSTEOLOGÍA
Y METABOLISMO MINERAL

DENSIDAD MINERAL ÓSEA Y SCORE DE HUESO TRABECULAR EN ADULTOS CON HIPOFOSFATEMIA LIGADA AL CROMOSOMA X Y OSTEOMALACIA INDUCIDA POR TUMOR

Alberth Burnier Cáceres¹, Macarena Jimenez Vial², Luciana Pinto Valadares³, Annette Lucy Madison Rostagno², Danisa Nevenka Ivanovic-zuvic Seeger⁴, Maria Belen Zanchetta⁵, Pablo Felipe Florenzano Valdes²

1. Servicio de Medicina Interna. Departamento de Endocrinología. Hospital Las Higueras, Talcahuano. Chile.

2. Departamento de Endocrinología. Pontificia Universidad Católica de Chile.

3. Rede SARA de Hospitais de Reabilitação. Brasilia. Brasil.

4. Hospital Salvador/Universidad de Chile. Santiago de Chile.

5. Instituto de Investigaciones Metabólicas - Universidad del Salvador. Buenos aires. Argentina.